



JAK SE OČKUJE

Základní očkovací schéma – pro chladné měsíce



Zkrácené očkovací schéma – pro teplé měsíce



**UPOZORNÍME VÁS NA DALŠÍ DÁVKU.
ZAREGISTRUJTE SE NA
WWW.POZORKLISTE.CZ**

Výdej vakcín je vázán na lékařský předpis. Vakcíny aplikuje lékař. Pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Vakcíny nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Informace o výši příspěvku na očkování poskytnou příslušné zdravotní pojišťovny.

PROČ JE DOBRÉ SE NECHAT OČKOVAT

- Vzhledem k vysokému výskytu nakažených klíšťat na území ČR* je očkování proti klíšťové encefalitidě vhodné pro dospělé a děti, kteří žijí nebo cestují na území ČR.
- Klíšťová encefalidita je závažné onemocnění s možnými následky, zvláště u dospělých.
- Očkování proti klíšťové encefalitidě zvyšuje jistotu, že se vy a vaše děti můžete klidně pohybovat venku bez obav z nákazy touto nemocí.
- Očkování vakcínami FSME-IMMUN je dlouhodobě prověřeno 30letou praxí.

*zdroj: Interní zdroj Baxter vydaný v roce 2011

VÍCE INFORMACÍ NA

www.pozorkliste.cz

VOLEJTE NA BEZPLATNOU LINKU

800 202 010

(Po–Pá 9–17 hod.)

BAXTER CZECH spol. s r. o.

Karla Engliše 3201/6, Praha 5, 150 00

tel.: +420 225 774 111

fax: +420 225 774 250

Klíšťová encefalidita se týká i vás!



**Myslete taky na sebe.
Nechte očkovat nejen své
děti, ale i sebe.**

**Získejte nyní příspěvek na
očkování u vaší pojišťovny!**

www.pozorkliste.cz

Baxter

NAKAŽENÁ KLÍŠTATA SE VYSKYTUJÍ TĚMĚŘ PO CELÉ ČR



Interní zdroj Baxter vydaný v roce 2010.

- oblasti s vysokým výskytem onemocnění KE
- jednotlivé případy výskytu onemocnění KE

Klíště můžete chytit i na zahrádce nebo při procházce v městském parku.

Nakažené klíště může způsobit klíšťovou encefalitidu, onemocnění se závažným průběhem i následky.

Klíšťovou encefalitidou se můžete nakazit:

- při rekreačních aktivitách v přírodě
- procházkách v parku
- sportování (cyklistika, běhání, in-line brusle a další)
- venčení psa nebo odstraňování klíštěte z jeho srsti
- sběru hub a lesních plodů
- zahradničení atp.

PROJEVY ONEMOCNĚNÍ KLÍŠŤOVOU ENCEFALITIDOU¹

Klíšťová encefalitida je virové onemocnění mozku a mozkových plen. Ačkoli většina nálezů probíhá asymptomaticky, může infekce v některých případech vyústit v závažné onemocnění - klíšťovou encefalitidu. Virus se nejčastěji přenáší přisátím nakaženého klíštěte. Onemocnění má obvykle dvoufázový průběh.

První fáze připomíná lehkou chřipku (zvýšená teplota, únava, bolesti hlavy, svalů a kloubů).

V druhé fázi nemoci se pacientovi přitíží – to již virus pronikl do mozku. Mohou nastoupit silné bolesti hlavy provázené horečkou. Nemocný je světloplachý, přidává se nevolnost a zvracení. Příznakem poškození nervového systému je ztuhnutí svalů na šíji, nervové obrny, závratě, poruchy spánku, paměti, dezorientace a porucha vědomí. Pacient musí být hospitalizován a teprve poté obvykle dojde k postupnému zlepšování stavu. Nemocný může někdy i po vyléčení trpět bolestmi hlavy nebo dokonce částečnou obrnou.

Jak onemocnění, tak i jeho následky mají u dospělých většinou těžší průběh než u dětí. Závažnost nemoci u starších osob se projevuje vyšším počtem obtíží během akutní nemoci a vyšším počtem dnů strávených v lékařské péči. Může dojít k výskytu obrny a dlouhodobých následků, které mohou způsobit dlouhou pracovní neschopnost a tím zhoršit kvalitu života člověka.

Více informací najdete na
www.pozorkliste.cz
www.klistova-encefalitida.cz

¹ převzato z Lindquist L, Vapalahti O. Tick-borne encephalitis. Lancet 2008; 371: 1861–71

ÚČINNOU OCHRANOU PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ JE OČKOVÁNÍ

Lékaři dovedou částečně léčit příznaky této nemoci, nikoli však její příčinu.

KDE SE NECHAT OČKOVAT

- u svého praktického lékaře
- děti u praktického lékaře pro děti a dorost
- v očkovacím centru (seznam najdete na www.pozorkliste.cz)

O VAKCÍNÁCH

- vakcíny proti klíšťové encefalitidě, které jsou prověřené více než 30letou praxí, se nazývají FSME-IMMUN 0,5 ml BAXTER (pro dospělé od 16 let) a FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER (pro děti od 1 roku)
- vakcíny FSME-IMMUN jsou v České republice nejprodávanějšími vakcínami proti klíšťové encefalitidě*
- základní očkovací schéma tvoří 3 dávky
- cena jedné dávky je cca 550 Kč

Léčivá látka:
Virus encephalitis
inactivatum purificatum

Vakcíny proti klíšťové
encefalitidě



*zdroj: výpočet proveden z prodejní databáze IMS dat na základě prodejů vakcín proti klíšťové encefalitidě v roce 2011

Baxter