



NERISKUJTE ZBYTEČNĚ

NECHTE SEBE A SVÉ DĚTI OČKOVAT PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ

Infikovaná klíšťata se vyskytují téměř po celé ČR

Klíště může způsobit onemocnění se závažným průběhem i následky

Počet nakažených klíšťovou encefalitidou roste¹⁾



Adaptace z interního zdroje Baxter vydaného v roce 2010.

- oblasti s vysokým výskytem onemocnění KE
- jednotlivé případy výskytu onemocnění KE

JSTE OHROŽENI I VY?

Pracujete venku nebo v přírodě?

Trávíte volný čas venku sportováním, turistikou, zahrádkařením nebo houbařením?

Staráte se o psa, kočku nebo hospodářská zvířata?

Jezdíte na výlety nebo dovolenou do přírody?

Chodíte na procházku do parku?

Odstraňujete někdy prisáté klíšťe?

Odpověděli jste alespoň 1x ANO

Můžete chytit nakažené klíšťe, které může způsobit klíšťovou encefalitidu.

Poradte se se svým lékařem.



FSME-IMMUN 0,5 ml BAXTER, FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER.

Pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Léčivá látka: Virus encephalitidis inactivatum purificatum. Vakcíny proti klíšťové encefalitidě. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Vakcíny aplikuje lékař. Vakcíny nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Informace o výši příspěvku na očkování poskytnou příslušné zdravotní pojišťovny.

¹⁾ www.szu.cz/publikace/data/infekce-v-cr (leden 2011)