

Jak správně odstranit klíště

Zeptejte se svého lékaře na očkování proti klíšťové encefalitidě!



Krok č. 1: Nejprve si připravte speciální kleštičky nebo pinzetu a navlékněte si gumové rukavice.



Krok č. 2: Klíště zakápněte desinfekcí.



Krok č. 3: Pak klíště uchopte pinzetou co nejbliže k povrchu kůže a viklavými pohyby jej pomalu a opatrně vytáhněte. Snažte se, abyste klíště nepřetrhli.



Krok č. 4: Místo přisátí je vhodné opět potřít desinfekcí. Klíště zlikvidujte bezpečným způsobem (např. spláchnutím do WC nebo spálením).

Účinnou ochranou proti klíšťové encefalitidě je očkování. Neriskujte zbytečně. Nechte očkovat nejen své děti, ale i sebe.



www.pozorkliste.cz

FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER; FSME-IMMUN 0,5 ml BAXTER

Léčivá látka: Virus encephalitis inactivatum purificatum. Vakcíny proti klíšťové encefalitidě. Výdej léčivých přípravků (vakcín) je vázán na lékařský předpis. Vakcíny aplikuje lékař. Pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Baxter